

Si informano i pazienti che, alla luce del recente aumento dei casi di virus di West Nile (WNV), di virus del vaiolo delle scimmie (monkeypox virus – MPXV) e di virus Dengue (DENV), il Servizio di PMA ha deciso di adottare le misure preventive raccomandate dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (ECDC).

- Virus di West Nile (WNV)

In caso di soggiorno anche solo per una notte nei 28 giorni precedenti il prelievo di gameti (ovociti/sperma) nelle provincie di Bologna, Chieti, Ferrara, Mantova, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo o nei distretti di Bacău, Bihor, Ialomița, Iași, Olt, Prahova, Sibiu, Vaslui (Romania), nella contea di Bács-Kiskun (Ungheria), nelle unità periferiche Kilikis, Rodopi e Xanthi (Grecia) e nella provincia di Valencia (Spagna) e nell'isola di Cipro, il prelievo dovrà essere temporaneamente sospeso e rimandato a 28 giorni dopo il soggiorno. Chiediamo gentilmente a tutti i pazienti di comunicare con tempestività l'eventuale comparsa di sintomi neurologici (forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi alla vista, torpore, convulsioni, fino alla paralisi e al coma). In tal caso sarà necessario sottoporsi al test di screening per il virus di West Nile. (test WNV NAT).

- Virus del vaiolo delle scimmie (MPXV)

Si invitano i pazienti a segnalare eventuali contatti stretti con casi confermati o sospetti o probabili di MPXV o viaggi in aree interessate da casi confermati di MPXV (ad es. Canarie) o in paesi endemici del MPXV (Africa centrale e occidentale, soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo (RDC, ex Zaire), Benin, Cameroon, Repubblica Centrale Africana, Gabon, Ghana, Costa d'Avorio, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, e Sudan del Sud. In tali casi andrà sospeso il prelievo di gameti per 21 giorni a partire dall'ultimo giorno di esposizione. Si ricorda che i sintomi da valutare e segnalare prontamente possono essere molto lievi ed aspecifici (mal di testa, affaticamento, lesioni cutanee anogenitali). In caso di infezione accertata da MPXV sarà possibile procedere al prelievo di gameti dopo 21 giorni dalla diagnosi ed in assenza di sintomi.

- Virus Dengue (DENV)

Si invitano i pazienti a segnalare soggiorni, anche solo per una notte e nei 28 giorni precedenti il prelievo di gameti, nei Dipartimenti francesi del Var, del Vaucluse (Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra) e della Drôme (regine Alvernia-Rodano-Alpi). In questi casi, anche in assenza di sintomatologia, sarà richiesto di effettuare un test PCR Dengue entro le 72 ore dal prelievo. Il prelievo andrà rimandato a 28 giorni dopo il soggiorno in assenza di sintomi e a 120 giorni dalla risoluzione dei sintomi nei pazienti con anamnesi positiva per infezione da DENV. N.B. Le suddette aree a rischio potrebbero subire ulteriori aggiornamenti consultabili, per maggiori informazioni, sul sito ufficiale del I.S.S.

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione ai fini di garantire che tutte le procedure siano eseguite nella massima sicurezza.